NITRADINE®

Patented Anti-Gingivitis Formula

ortho Junior BRUXISM TABS Snoro TABS Denture Care Danger

Manufactured by:

bonyf AG

Heiligkreuz 16
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein - EUROPE
Tel: +423 232 78 15
www.bonyf.com

Swiss Made

Ingredients: Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Citrate, Potassium Monopersulfate, Sodium Carbonate, Peppermint Flavour, PVP.

3570026260001 - 0000-0008-4

(FR) Mode d'utilisation:

Ce produit est utilisable sur les appareils (dispositifs médicaux) suivants : appareils dentaires amovibles, appareils orthodontiques amovibles, gouttières anti-crissement et orthèses d'avancées mandibulaires anti-ronflement.

Emballage

Le produit est disponible en boîte de 12, 20, 32 et 64 comprimés. Le conditionnement est inscrit sur la boîte.

Précautions d'emploi

A usage externe seulement. Arrêter la solution après utilisation. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants ou aux parfums. Ne pas mettre le comprimé en bouche. La poudre des comprimés peut causer des dommages oculaires. Ne pas boire la solution n'en servir comme boisson ou bain de bouche. Bien rincer l'appareil dentaire avant de le remettre en bouche. Arrêter l'utilisation et demander un avis médical si irritations, de même si des gonflements ou douleurs apparaissent après la première ou ultérieures utilisations. Lire les instructions avant utilisation. Stocker dans un endroit sec. Comprimé à usage unique.

Danger

Danger

Comprimé sec: Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'irritation cutanée: consulter un médecin. Contient Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate), Contient Dipotassium peroxodisulfate. Peut provoquer une réaction allergique. Contient Cinnamal ou Menthe arvensis oil. Peut produire une réaction allergique.

Mode d'utilisation

1. Rincer l'appareil sous l'eau courante. Si nécessaire, utiliser une brosse à dents ou une brosse à prothèses pour retirer les résidus alimentaires éventuels.
2. Déposer l'appareil dans un verre de 150 ml d'eau chaude (33 °C - 47 °C) en veillant à l'immerger totalement et ajouter immédiatement 1 comprimé. Tremper pendant 15 minutes au minimum pour l'essayer de la réduction du biofilm. L'appareil peut tremper en toute sécurité pendant la nuit.

Remarque : un comprimé cassé ne compromet en rien l'efficacité et l'utilisation du produit (à condition d'utiliser tout le comprimé).

3. Retirer l'appareil de la solution et le rincer abondamment sous l'eau avant de la remettre en bouche. Si un goût persiste sur l'appareil après l'avoir remis en bouche, le plonger dans de l'eau tiède pendant 10 minutes.

Dosage recommandé: commencer le traitement par une utilisation quotidienne du comprimé pendant 21 jours. Ceci permet de garantir la réduction du biofilm. Il est ensuite possible d'adapter l'utilisation en fonction des besoins avec un usage minimal de 2 fois par semaine. Ce produit a une efficacité prouvée contre Candida albicans, P. aeruginosa et S. aureus.

NE PAS BOIRE | NE PAS INGÉRER | TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS | RINCER AVANT UTILISATION

(NL) Gebruiksaanwijzing:

Dit product kan worden gebruikt op de volgende apparaten: uitneembare protheses, uitneembare orthodontische apparatuur, anti-bruxisme, anti-snurk en mandibular apparatuur.

Verpakking

Dit product is beschikbaar in de volgende verpakkingen: 12, 20, 32 en 64. Het aantal tabletten in dit pakket is vermeld op de verpakking.

Waarschuwingen bij gebruik

Uitsluitend gebruik. Oplossing na gebruik weggooien. Niet gebruiken indien allergisch voor een of meerdere ingrediënten. Tablet niet in de mond nemen. Bruisbaletpoeder kan de ogen beschadigen. De oplossing niet drinken of gebruiken als mondspoelmiddel. Gebitsprothese grondig naspoelen alvorensteeg in de mond te plaatsen. Behandeling onmiddellijk stopzetten indien er zich irritaties, pijn of zwellingen voordoen tijdens of na gebruik. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Bewaren in een droge ruimte. Enkel eenmalig gebruik.

Gevaar

Gevaar

Droog tablet: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Na het werken niet dit product handen grondig wassen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bevat Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate), Bevat Dipotassium peroxodisulfate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat Cinnamal of Menthe arvensis oil. Kan een allergische reaktie veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

1. Spoel uw voorziening schoon onder stromend water. Gebruik indien nodig een tandenborstel of prothese- borstel om voedselresten te verwijderen.
2. Doe de voorziening in een glas met 150 ml van 33°C-47°C water. Zorg dat hij volledig is ondergedompeld en doe direct 1 tablet in het water. Laat de oplossing 15 min. weken om te zorgen dat de biofilm wordt afgebroken. U kunt uw voorziening veilig laten weken gedurende de nacht.

N.B.: Als uw tablet is gebroken heeft dat geen effect op de werking en het gebruik van het product (zo lang u maar de hele tablet gebruikt).

3. Neem het apparaat uit de oplossing en spoel het goed af met water voor u het weer terug in de mond doet. Als u merkt dat uw apparaat een rare smaak heeft als u het in uw mond doet, leg het dan gedurende 10 minuten in lauwwarm water.

Aanbevolen dosering: Begin de behandeling met 21 dagen waarin u elke dag één tablet gebruikt. Hierdoor wordt de biofilm afgebroken. Daarna kunt u het gebruik zo verminderen dat het pad bij uw behandelaar, maar gebruik het middel minimaal 2 keer per week. Dit product werkt aantoonbaar tegen Candida albicans, P. aeruginosa en S. aureus.

NIET DRINKEN | NIET INSLIKKEN | BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN | SPOELEN VOOR GEBRUIK

(FI) Käyttöohje:

Tuote sopii käytettäväksi seuraavien irrotettavien suun laitteiden kanssa: hammasproteesit, oikomiskojeet, purentakiskot, uniapneakiskot ja mandibula tuki-kiskot.

Pakkaus

Pakkauskoot: 12, 20, 32 ja 64 tablettia. Tablettien lukumäärä ilmoitetaan pakkauksessa.

Käyttöön liittyvät varotoimet

Vain ulkoisen käyttöön. Hylkää liuos käytön jälkeen. Älä käytä mikäli olet allerginen tuotteen ainesosille tai parfyymeille. Ei saa laittaa tablettia suuhun. Tablettien jauheen silmäkontakti kielletty. Älä juo tai käytä suuvetenä. Huuhtele kojesi hyvin ennen suuhun laittamista. Lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, mikäli ylläreikoja, turvotusta tai kipu yms. oireita ilmaantuu heti tai myöhemmin. Tutustu käyttöohjeisiin. Säilytä kuivassa paikassa. Tuote on kertakäyttöinen.

Vaara

Vaara

Kuiva tabletti: Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huolto huolellisesti vedellä useita minuutin ajan. Poista palkoistut, ellei niitä tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärin. JOS KEMIKAALI JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ärsytys tai ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkärin luokse. Sisältää Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate), Sisältää Dipotassium peroxodisulfate. Voi aiheuttaa allergeen reaktion. Sisältää Cinnamal tai Menthe arvensis oil. Voi aiheuttaa allergeen reaktion.

Käyttöohje

1. Huuhtele hammasolosi juoksevalla vedellä. Poista tarvittaessa ruoanjäämät hammasharjalla tai hammas- proteesharjalla.
2. Aseta hammaslaite 150 ml lämmintä vettä (33–47 °C) sisältävään lasiin. Varmista, että hammaslaite on kokonaan vedenpinnan alapuolella, ja aseta 1 tabletti heti veteen. Anna liuottaa vähintään 15 minuutin ajan, jotta biofilmi voimistuisi biofilmin poiston. Voit haluttaa antaa vaikuttaa yön yylä.

Huomautus: Jos tabletti on murtunut, sillä ei ole vaikutusta tuotteen tehoon ja käyttöön (edellyttäen, että koko tabletti käytetään).

3. Ota protees/laite laitosta ja huuhdo juoksevalla vedellä hyvin ennen uudelleen laittamista suuhun. Mikäli laitteesen jää makua, laita se 10 minuutiksi haalean veteen.

Annostelusuositus: Aloita hoito käyttämällä yhden tabletin päivässä 21 päivän ajan. Tämä takaa biofilmin vähenemisen ohjeasille tasolle. Voit sitten muuttaa käyttöä tarpeen mukaan vähintään 2 kertaa viikossa. Tuotteen tehokkuus on todistettu tehoavan Candida albicans -hiivaisenen sekä P. aeruginosa- ja S. aureus -bakteenrien.

EI SAA JUODA | EI SAA NIELLÄ | SÄILYTÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA | HUUHTELE ENNEN KÄYTTÖÄ

(AR) دليل الاستعمال:

يمكن استخدام هذا المنتج على الأجهزة التالية: الأطقم الأسنان الغير ثابتة، أجهزة تقويم الأسنان الغير ثابتة، الأجهزة المستعملة ضد صرير الأسنان وضد الشخير، وأجهزة تقديم الفك السفلي.

العبوة

المنتج متوفر في أحجام علب تحتوي على عدد أقراص التالية: 12، 20، 32 و 64، يمكن إيجاد عدد الأقراص الواردة في هذه المجموعة على علبة المنتج.

تحذير الاستخدام

للاستعمال الخارجي فقط. يجب التخلص من المحلول بعد الاستعمال. لا تستعمل المنتوج في حالة وجود حساسية مع أحد المكوّنات أو العطورات. لا تضع القرص في الفم. قد يسبب مسحوق القرص أضرار بالعين. لا يجب شرب المحلول أو استخدامه كغسول للفم. لتنظيف طقم الأسنان جيدا قبل إعادته إلى الفم. يجب التوقف عن استعمال المنتوج وإستشارة الطبيب في حالة ظهور بعض المشاكل أو إلتهابات بعد أول استعمال أو أحداث أخرى. اقرأ التعليمات الإستخدام. يجب وضع المنتوج في مكان جاف. صالح للاستعمال مرة واحدة فقط.

خطر

خطر

قرص جاف: يسبب تهيج البشرة. يسبّب في يسبب أضرار بالعين. يجب غسل اليدين جيدا بعد الإستعمال. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة للعين: تخلص بلطف بعض بضعة دقائق. يجب إزالة العدسات اللاصقة إذا كانت موجودة إذا يجب مواصلة التخلص. يجب الإتصال فورا بمركز مكافحة السموم أو الطبيب. في حالة ملامسة العين: قم بتخليها بحذر بالماء والصابون. إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: إطلب مشورة طبية. يحتوي على Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate) Dipotassium peroxodisulfate. يحتوي على Cinnamal أو Menthe arvensis oil. يمكن أن يحدث تفاعل تحسسي.

دليل الاستعمال

1. اغسل طقم الأسنان تحت الماء الجاري. في حالة الضرورة، استعمل فرشاة أسنان أو فرشاة طقم الأسنان لإزالة أي بقايا طعام.
2. ضع الجهاز في كوب به 150 مل من الماء الدافئ (33 درجة مئوية - 47 درجة مئوية) مع التأكد أنه مغمور بالكامل وضع قرصا واحدا في الماء على الفور. انقع الجهاز لمدة 15 دقيقة على الأقل لضمان تقليل طبقة الحماية الحيوي الرقيق. يمكنك أن تنقع جهاز طوال الليل بأمان.

ملحوظة: إذا كان القرص الخاص بك مكسورًا فلن تتأثر فعالية المنتج أو قابليته للاستخدام (شريطة استخدام القرص بالكامل).

3. قم بإزالة جهاز الأسنان من المحلول وشطفه جيداً تحت الماء قبل إعادة وضعه في فمك. في حالة إستمرار وجود مذاق غريب على الجهاز أثناء إعادة استعماله في فمه، فانقع الجهاز في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق.

الجرعة الموصى بها: أبدأ العلاج باستخدام القرص يومياً لمدة 21 يوماً. سيضمن هذا تخفيض طبقة الحماية الحيوي الرقيق إلى مستوى أقل. وبمكنك بعد ذلك تعديل الاستخدام، بناءً على توجيه مقدم رعايتك، إلى أدنى الاستخدام مرتين في الأسبوع. هذا المنتج له فعالية مثبتة ضد الميكروبات البيضاء، والزائفة الزنجارية، والعقدية الذهبية.

لا تشربه | لا تبلعه | يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال | الغسل قبل الإستخدام

(EN) Instructions for use:

This product can be used on the following appliances: removable dentures, removable orthodontic appliances, anti-bruxism and anti-snoring devices (mandibular advancement devices).

Packaging

Product available in the following tablet box sizes: 12, 20, 32 and 64. The number of tablets contained in this package can be found on the front of the product box.

Precautions for use

For external use only. Discard solution after use. Do not use if allergic to any of the ingredients or to perfumes. Do not put tablet in mouth. Tablet powder may cause eye damage. Do not drink the solution or use as a mouthwash. Rinse appliance well before replacing it in your mouth. Discontinue use and seek medical attention if any irritation, swelling or pain develops following the first or any later use. Consult instructions for use. Store in a dry place. For single use only.

Danger

Danger

Dry tablet: Causes skin irritation. Causes serious eye damage. Wash hands thoroughly after handling. Keep out of reach of children. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Contains Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Contains Dipotassium peroxodisulfate. May produce an allergic reaction. Contains Cinnamal ou Menthe arvensis oil. May produce an allergic reaction.

Instructions for use

1. Rinse your appliance under running water. If necessary use a toothbrush or denture brush to remove any food debris.
2. Place the appliance in a glass of 150 ml of warm (33°C - 47°C) water ensuring that it is fully immersed and immediately place 1 tablet in the water. Soak for a minimum of 15 mins to ensure reduction of the biofilm. You may safely soak your appliance overnight.

NB: If your tablet is broken the efficacy and usage of the product will not be affected (provided the whole tablet is used).

3. Remove the appliance from the solution and rinse well under water before replacing it in the mouth. If a taste should remain on your appliance after replacing it in your mouth, place it in warm water for 10 mins.

Recommended usage: Begin the treatment with a daily use of the tablet for 21 days. This will ensure the reduction of the biofilm to a lower level. You can then adjust the usage based on your needs with a minimum usage of 2 times per week. This product has a proven efficacy against Candida albicans, P. aeruginosa, and S. aureus.

DO NOT DRINK | DO NOT INGEST | KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN | RINSE BEFORE USE

(IT) Istruzioni per l'uso:

Questo prodotto può essere usato sui seguenti apparecchi estraibili : dentiere, apparecchi ortodontici, anti-bruxismo, anti-russamento e di avanzamento mandibolare.

Imballaggio

Prodotto disponibile nei seguenti formati : 12-20- 32-64 compresse. Il numero di compresse contenute in questa confezione è riportato sulla scatola del prodotto.

Precauzioni d'uso

Solo per uso esterno. Eliminare la soluzione dopo l'uso. Non usare se allergici a qualche ingrediente o ai persoffati. Non mettere in bocca la compressa. La compressa può causare danni agli occhi. Non bere la soluzione, non usarla come collutorio. Sciacquare bene l'apparecchio estraibile prima di rimetterlo in bocca. Interrompere l'uso e rivolgersi al medico in caso di irritazione, gonfiore, o dolore che si sviluppa dopo il primo uso o in seguito. Leggere le istruzioni d'uso. Tenere in luogo asciutto. Solo monouso.

Pericolo

Pericolo

Compressa secca: Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Contiene Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Contiene Dipotassium peroxodisulfate. Può provocare una reazione allergica. Contiene Cinnamal ou Menthe arvensis oil. Può provocare una reazione allergica.

Istruzioni per l'uso

1. Sciacquare l'apparecchio sotto acqua corrente. Se necessario, utilizzare uno spazzolino da denti o uno spazzolino per protesi per rimuovere eventuali residui di cibo.
2. Collocare l'apparecchio in un bicchiere contenente 150 ml di acqua calda (33°C - 47°C), assicurandosi che sia completamente immerso, quindi aggiungere immediatamente 1 compressa all'acqua. Lasciare in immersione per almeno 15 minuti per garantire un'efficace riduzione del biofilm. È possibile lasciare l'apparecchio immerso per tutta la notte.

N.B.: l'efficacia e l'uso del prodotto non vengono compromessi se la compressa è rotta (a condizione che venga usata l'intera compressa).

3. Prelevare l'apparecchio estraibile dalla soluzione e lavarlo accuratamente sotto l'acqua corrente prima di reintrodurlo in bocca. Se una volta reintrodotto in bocca, dovesse avere uno strano sapore, immergere nuovamente in acqua tiepida per 10 minuti.

Posologia raccomandata: cominciare il trattamento usando una compressa una volta al giorno per 21 giorni. Ciò assicura la riduzione al minimo del biofilm. È possibile adattare la posologia in base alle proprie esigenze, prevedendo comunque un utilizzo di almeno 2 volte alla settimana. Questo prodotto ha un'efficacia dimostrata contro patogeni quali Candida albicans, P. aeruginosa e S. aureus.

NON BERE | NON INGERIRE | TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI | SCIACQUA RE PRIMA DELL'USO

(ES) Instrucciones de uso:

Este producto puede ser utilizado en: dentaduras removibles, aparatos de ortodoncia removibles, férulas de descarga antibruxismo, férulas antironquidos y dispositivos de avance mandibular.

Embalaje

Producto disponible en los siguientes formatos: 12, 20, 32 y 64 comprimidos. El número de comprimidos contenidos en este estuche lo encontrará en la caja del producto.

Precauciones de uso

Solo para uso externo. Deseche la solución después de su uso. No use los comprimidos si es alérgico a algún ingrediente o a los perfumáticos. No introduzca el comprimido en la boca. El polvo del comprimido puede causar daños en los ojos. No beba la solución ni la use como enjuague bucal. Enjuague bien la dentadura antes de volver a colocársela. Deje de usar los comprimidos y acuda al médico si sufre irritación, hinchazón o dolor después del primer uso o en cualquier uso posterior. Consulte las instrucciones de uso. Consérvese en un lugar seco. Producto de un solo uso.

Peligro

Peligro

Comprimido seco: Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si fuera y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Contiene Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Contiene Dipotassium peroxodisulfate. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene Cinnamal ou Menthe arvensis oil. Puede provocar una reacción alérgica.

Instrucciones de uso

1. Enjuague la dentadura bajo agua corriente. En caso necesario, utilice un cepillo dental o para dentaduras para eliminar cualquier resto de comida.
2. Meta la dentadura en un vaso con 150 ml de agua caliente (33 °C - 47 °C) para garantizar que quede totalmente inmersa y a continuación añada una pastilla al agua. Sumérjala durante al menos 15 mins para garantizar la reducción de la biopelícula. Puede sumergir su ortodoncia durante la noche de forma segura.

Nota: La eficacia y el uso de la pastilla no se verán mermados aunque esté rota (si se usa la pastilla entera).

3. Retirar el aparato de la solución y aclarar bien con agua antes de volver a colocarlo en la boca. Si al ponérselo nota algún sabor, dejar en agua templada durante 10 minutos.

Dosis recomendada: comience el tratamiento con una pastilla diaria durante 21 días. De esta forma garantiza la reducción de la biopelícula a un nivel inferior. Después podrá ajustar su uso según sus necesidades, con un uso mínimo de 2 veces por semana. Este producto es de eficacia probada contra la Candida albicans, la P. aeruginosa, y el S. aureus.

NO BEBER | NO INGERIR | MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS | ENJUAGAR ANTES DE USAR

(DE) Gebrauchsanweisung:

Dieses Produkt kann für folgende Dentalapparaturen verwendet werden: herausnehmbarer Prothesen, herausnehmbare Zahnspangen, Anti-Knirschschienen, Anti-Schnarchschienen und mandibulare Protrusionsschienen.

Verpackung

Das Produkt ist in den folgenden Verpackungsgrößen verfügbar: 12, 20, 32 und 64 Tabletten. Die Anzahl der in der Packung enthaltenen Tabletten finden Sie auf der Produktverpackung.

Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung

Nur zur äußerlichen Anwendung. Entsorgen Sie nach dem Gebrauch die Lösung. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie auf eine Zutat oder Parfum allergisch sind. Nehmen Sie keine Tablette in den Mund. Das Pulver der Tabletten kann Augenreizungen auslösen. Die Lösung darf nicht getrunken werden oder als Mundwasser verwendet werden. Vor dem Einsetzen der Prothese, gut abspülen. Sollten Sie nach erstmaliger und weiterhin/ Anwendung eine Irritation der Schleimhäute, Schwellung, Schmerzen oder Beschwerden bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und suchen Sie ärztlich Rat. Gebrauchsanweisung beachten. Trocken aufbewahren Nur zum einmaligen Gebrauch.

Gefahr

Gefahr

Trockene Tablette: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort CVP/Giftnotzentrum oder Arzt/Ärzte kontaktieren. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arzt/Ärzte konsultieren. Enthält Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Enthält Dipotassium peroxodisulfate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Cinnamal oder Menthe arvensis oil. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gebrauchsanweisung

1. Spülen Sie Ihre Zahnprothese/Zahnspangeratur gründlich unter laufendem Wasser ab. Benutzen Sie, falls erforderlich, eine Zahn- oder Prothesenbürste, um eventuell vorhandene Nahrungsreste zu entfernen.
2. Legen Sie die Zahnprothese in ein Glas mit ca. 150 ml warmes Wasser (33–47 °C). Achten Sie darauf, dass die Prothese vollständig mit Wasser bedeckt ist, und geben Sie sofort eine Tablette in das Wasser. Die Prothese sollte mindestens 15 Minuten in der Lösung liegen, um eine Reduktion des Biofilms sicherzustellen. Sie können Ihre Zahnprothese auch problemlos über Nacht in der Lösung lassen.

Anm.: Falls die Tablette zerbrochen ist, hat dies keinen Einfluss auf die Anwendung und Wirksamkeit des Produkts (vorausgesetzt, Sie geben alle Bruchstücke, also die gesamte Tablette, in das Glas).

3. Die Zahnprothese aus der Lösung nehmen und gut unter fließendem Wasser abspülen, bevor Sie diese wieder in den Mund nehmen. Wenn Sie nach dem Einsetzen einen bestimmten Geschmack bemerken, legen Sie die Zahnprothese für 10 Minuten erneut in lauwarmes Wasser.

Empfohlene Dosierung: Beginnen Sie die Behandlung mit der täglichen Verwendung einer Tablette für 21 Tage. Dadurch wird die Reduktion des Biofilms auf ein niedrigeres Niveau sichergestellt. Danach können Sie die Verwendung an Ihre Bedürfnisse anpassen: Sie jedoch mindestens 2-mal pro Woche die Prothese mit jeweils einer (aufgelösten) Tablette reinigen. Dieses Produkt ist nachweislich gegen die Mikroorganismen Candida albicans, P.aeruginosa und S. aureus wirksam.

NICHT TRINKEN | NICHT SCHLUCKEN | DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN | VOR VERWENDUNG ABSPÜLEN

(SV) Bruksanvisning:

Produkt kan användas med denna listagbar mun apparat: löstander, ortodontik apparat, anti-bruxism apparat, sömnapne apparat och mandibula apparat.

Förpackning

Förpackning storlek: 12, 20, 32 och 64 tabletter. Antal av tabletter annonserar i packningen.

Försiktighetsåtgärder för användning

Endast för externt bruk. Förstöra lösningen efter bruk. Använd inte om du är allergisk för produkts beståndsdelar eller parfumämnen. Placera inte tabletten i munnen. Tablet pulver kontakt med öga är förbjuden. Dricka inte och använd inte som munvatten. Skölj apparat för att rensa det innan du sätter i munnen. Sluta användningen och kontakt med doktor om allergisk reaktioner eller värk osv. dyker up strax eller senare. Läs den här instruktion. Lagras i torr plats. Produkt är engång användig.

Varning

Varning

Torr tablett: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvara oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta av eventuella kontaktlinser om det går att. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket hull och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehåller Pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Innehåller Dipotassium peroxodisulfate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller Cinnamal och Menthe arvensis oil. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Bruksanvisning

1. Skölj användningen under rinnande vatten. Använd vid behov en vanlig tandborste eller protesstandborste för att ta bort eventuella matrester.
2. Lägg användningen i ett glas med 1,5 dl lauwarm vatten (33 °C–47 C), kontrollera att den täcker helt nedsänkt under vattnet och lägg sedan omedelbart 1 tablett i vattnet. Låt användningen ligga nedsänkt i lösningen i minst 15 minuter för att säkerställa att biofilmen reduceras. Användningen kan också ligga i lösningen över natten.

Märk: Det går inget om tabletten gått sönder. Om alla bitar av en tablett används påverkas varken effektiviteten eller användningen.

3. Ta apparat från vatten och skölj väl under rinnande vatten innan den sätts på plats i munen. Om apparat har tillvidare smak lägg den i ljumt vatten för 10 minuter.

Rekommenderad dos: Börja behandlingen med en tablett om dagen i 21 dagar. Det säkerställer att biofilmen reduceras till en lägre nivå. Därefter kan användningen anpassas efter behovet, med en minsta användning på 2 gånger i veckan. Den här produkten har bevisad effektivitet mot Candida albicans, P. aeruginosa och S. aureus.

FÅR EJ DRICKAS | FÅR EJ FÖRTÄRAS | FÖRVARAS OTILLÅTNA FÖRÄLDRAR | SKÖLJ FÖRE ANVÄNDNING